

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### **Gebrauchsinformation**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

### **Harpagoforte® 375 mg**

Kapsel mit 375 mg Wirkstoff

Wirkstoff: Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt

### **Stoffgruppe:**

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates und bei Verdauungsbeschwerden

### **Anwendungsgebiete:**

Zur unterstützenden Behandlung bei Verschleißerscheinungen (degenerativen Erkrankungen) des Bewegungsapparates. Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden wie Blähungen und Völlegefühl (dyspeptische Beschwerden). Wenn die Beschwerden länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

### **Was müssen Sie vor der Einnahme von Harpagoforte 375 mg beachten?**

#### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie Harpagoforte 375 mg nicht einnehmen?*

Das Arzneimittel darf bei Überempfindlichkeit gegen Teufelskralle oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sowie bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren nicht eingenommen werden.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Harpagoforte 375 mg ist erforderlich:**

Bei Gallensteinleiden nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

*Was muss bei Kindern und Jugendlichen beachtet werden?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es sollte deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen haben/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Warnhinweise:**

*Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von Harpagoforte 375 mg*

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Harpagoforte 375 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Harpagoforte 375 mg nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Harpagoforte 375 mg sonst nicht richtig wirken kann!

**Dosierung:**

*Wieviele Harpagoforte 375 mg Kapseln und wie oft sollten Sie Harpagoforte 375 mg anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahre 3x2 Hartkapseln ein.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

**Art der Anwendung:**

*Wie und wann sollten Sie Harpagoforte 375 mg anwenden?*

Hartkapseln nicht im Liegen einnehmen. Nehmen Sie die Hartkapseln bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

**Dauer der Anwendung:**

*Wie lange sollten Sie Harpagoforte 375 mg anwenden?*

Die Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt. Bitte beachten Sie jedoch die Angaben unter „Anwendungsgebiete“.

**Überdosierung und andere Anwendungsfehler:**

*Was ist zu tun, wenn Harpagoforte 375 mg in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigt oder versehentlich)?*

Benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Harpagoforte 375 mg eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?*

Wenn Sie die Einnahme von Harpagoforte 375 mg vergessen haben, nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

**Wenden Sie sich bei Fragen zur Klärung der Anwendung bitte an Ihren Arzt oder Apotheker!**

### **Nebenwirkungen:**

Wie alle Arzneimittel kann Harpagoforte 375 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10 000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Harpagoforte 375 mg auftreten?*

In seltenen Fällen sind Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerzen beobachtet worden. Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen [Hautausschläge, Nesselsucht, Gesichtsschwellung bis hin zum Kreislaufzusammenbruch (anaphylaktischer Schock)] beschrieben worden. Sehr selten wurde bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus ein Blutzuckeranstieg beobachtet, der nach Absetzen zurückging.

*Meldung von Nebenwirkungen:*

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Personal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum des Arzneimittels ist auf den Blistern und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

*Wie ist Harpagoforte 375 mg aufzubewahren?*

Nicht über 25° C aufbewahren.

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Achten Sie stets darauf, dass Sie Harpagoforte 375 mg so aufbewahren, dass sie für die Kinder nicht zu erreichen sind!

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

**Weitere Informationen:**

**Zusammensetzung:**

1 Hartkapsel enthält:

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:**

Trockenextrakt aus Teufelskrallenwurzeln (1,5-2,5 : 1)      375 mg

Auszugsmittel: Wasser

**Sonstige Bestandteile:**

Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Titandioxid (E 171), Eisenoxidhydrat (E 172)

**Darreichungsform und Inhalt:**

Originalpackung mit 20 Kapseln (N1)

Originalpackung mit 50 Kapseln (N2)

Originalpackung mit 100 Kapseln (N3)

**Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:**

Dyckerhoff Pharma GmbH & Co. KG

Robert-Perthel-Straße 49

D-50739 Köln

Tel: 0221 / 95 74 37 – 0

Fax: 0221 / 95 74 37 – 45

**Datum der letzten Überarbeitung:**

Juni 2015

**Sonstige Hinweise:**

Liebe Patientin, lieber Patient,

Harpagoforte 375 mg enthält als Wirkstoff einen Extrakt aus den Speicherwurzeln der Teufelskralle. Deren Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend und schmerzstillend. Daher

wird die Teufelskralle von den Bewohnern der Kalahari-Steppe seit Jahrhunderten als Naturheilmittel bei Gelenkerkrankungen genutzt. In neuen wissenschaftlichen Untersuchungen wurden diese Eigenschaften bestätigt.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Wirkung von Harpagoforte 375 mg – wie bei den meisten pflanzlichen Arzneimitteln – nicht sofort eintritt.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!